



DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

SPANISH INFORMATION FOR DOXYCYCLINE DOXICICLINA - ORAL

USOS: La doxiciclina es un antibiotico que se usa para el tratamiento de una gran variedad de infecciones bacterianas, incluyendo la prevencion de la "diarrea de viajero".

MODO DE EMPLEO: No importa si este medicamento se toma con los alimentos o entre comidas. Tome cada dosis con un vaso lleno de agua. Puede tomar este medicamento junto con los alimentos si sufre de malestar estomacal, a menos que su medico le indique lo contrario.

La suspension liquida de este medicamento debe agitarse bien antes de usarse.

Los antibioticos son mas efectivos cuando la cantidad del medicamento en su cuerpo se mantiene a un nivel constante. Para lograr esto, tome su medicamento a intervalos regulares durante el dia y la noche.

Continue tomando este medicamento hasta terminar completamente la cantidad indicada, aun si los sintomas desaparecen despu,s de unos cuantos dias. La suspension anticipada de este medicamento puede permitir que la bacteria continue desarrollandose, lo cual puede causar una reincidencia de la infeccion.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Puede causar malestar estomacal, diarrea, nausea, dolor de cabeza y vomitos durante los primeros cuantos dias, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Informe a su medico si estos sintomas persisten o se agravan.

La doxiciclina aumenta la sensibilidad a la luz del sol.

Avisé a su medico si comienza a sufrir de dificultades respiratorias, erupciones de la piel, urticaria o dolor de garganta mientras este tomando este medicamento.

PRECAUCIONES: Este medicamento no debe usarse durante el embarazo o cuando se esta amamantando. Consulte a su medico.

La doxiciclina puede hacer que sea mas propenso a las quemaduras por el sol. Use ropa protectora y un bloqueador solar.

Informe a su medico de toda su historia medica antes de tomar ningun medicamento.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS: Informe a su medico de todos los medicamentos que este usando, ya sea con o sin receta medica, especialmente si esta tomando otros antibioticos del tipo de la penicilina. Es posible que sea necesario cambiar su dosificacion.

Es posible que este medicamento disminuya la efectividad de los anticonceptivos orales. Consulte a su medico o farmaceutico acerca de otros metodos anticonceptivos.

Evite el consumo de productos lacteos y tomar antiacidos o preparados de hierro dentro de 2 a 3 horas de haber tomado tetraciclina. Estos productos tomados con el medicamento evitan su absorcion.

ADVERTENCIAS: Este medicamento ha sido indicado solamente para su condicion actual. No lo debe usar en otra ocasion para el tratamiento de una infeccion diferente ni lo debe dar a otra persona. Es posible que en esos casos sea necesario un medicamento diferente.

DOSIS OMITIDA: Si omite una dosis, tomela en cuanto que se acuerde; no la tome si esta cerca de la hora de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis que omitio y vuelva a su horario normal de dosificacion. No tome dosis doble para ponerse al dia.

CONSERVACION: Debe guardarse a temperatura ambiente, protegido de la humedad y de la luz del sol. No lo guarde en el cuarto de bano.



DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

Reviewed 12/19/16 by Cardinal Health Pharmacy Services