



MENSAJES IMPORTANTES DE CONSEJERIA PARA AQUELLOS TRATADOS POR TERAPIA DE SOCIOS ACELERADOS (EPT)

- 1) Los socios que tienen alergias a los antibióticos o que tienen problemas graves de salud no deben tomar los medicamentos y deben consultar a un proveedor de atención médica.
- 2) Los compañeros que tienen síntomas de una infección más grave (p. Ej., Dolor pélvico en mujeres, dolor testicular en hombres y fiebre en mujeres u hombres) no deben tomar los medicamentos EPT y deben buscar atención lo antes posible.
- 3) Los pacientes y las parejas deben abstenerse de tener relaciones sexuales durante al menos siete días después del tratamiento y hasta siete días después de que todas las parejas hayan sido tratadas, a fin de disminuir el riesgo de infección recurrente.
- 4) Los socios deben buscar una evaluación de ETS completa tan pronto como sea posible, independientemente de si toman la medicación.
- 5) Los socios deben leer el material informativo con mucho cuidado antes de tomar el medicamento.
- 6) Las parejas que están o podrían estar embarazadas deben buscar atención para su embarazo lo antes posible.
- 7) Se debe recomendar a los socios que soliciten servicios clínicos para volver a realizar la prueba tres meses después del tratamiento.
- 8) Los compañeros que están en riesgo de infección por gonorrea en la faringe (historial de practicar sexo oral en un hombre) deben ser informados de que los medicamentos EPT que se les administran pueden no curar la gonorrea faríngea en todos los pacientes. Estos socios deben buscar atención independientemente de si toman la medicación.

Suggest an edit