



TERAPIA DE PAREJA ACELERADA (EPT) INFORMACIÓN PARA SOCIOS

Es posible que haya estado expuesto a una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Es importante que te traten. Su pareja sexual fue tratada recientemente por _____, una infección que obtiene al tener relaciones sexuales con una persona que ya está infectada. Muchas personas con ETS no saben que tienen una infección porque no tienen signos o síntomas.

Si es alérgico al medicamento administrado o recetado a usted o a la clase farmacéutica de antibiótico, **NO TOMA ESTE ANTIBIÓTICO**. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato para un examen.

Es raro, pero algunas personas experimentan reacciones alérgicas graves. Estas reacciones pueden causar problemas para respirar, opresión en el pecho, cierre de la garganta, hinchazón de los labios o la lengua y urticaria (picazón en la piel). Si tiene alguno de estos problemas después de tomar este medicamento, llame inmediatamente al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

Después de tomar el medicamento que le dieron o le recetaron, no tenga relaciones sexuales durante 7 días para evitar infectar a otros. No tenga relaciones sexuales con sus parejas hasta que hayan sido tratados. No comparta estos medicamentos ni se los dé a nadie más.

Advertencia a las mujeres embarazadas: Si está embarazada o podría estar embarazada **NO TOMA ESTA MEDICINA**, contacte inmediatamente a un proveedor de atención médica para un examen y pruebas de ETS que puedan transmitirse a su bebé durante el embarazo y el parto.

Información sobre el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual curables

Es importante que tome todos los medicamentos recetados por su médico para curar la infección. También es importante que consulte a un proveedor de servicios de salud para que se haga un examen y se haga una prueba para detectar ETS y VIH. Si tiene una ETS, podría estar infectado con otra ETS al mismo tiempo. Es importante que se lo trate de manera completa y exitosa; de lo contrario, podría transmitir una ETS a las personas con las que tiene relaciones sexuales. Es importante que informe a sus parejas sexuales que también están en riesgo debido a que han estado expuestos a una ETS y que es importante que consulten a un proveedor de atención médica para un examen y tratamiento oportunos.

Información sobre la prevención de ETS

La única forma de evitar las ETS es no tener sexo vaginal, anal u oral. Si eres sexualmente activo, puedes hacer lo siguiente para reducir tus probabilidades de contraer ETS y VIH:

- Usar condones de manera consistente y correcta
- Elija actividad sexual menos riesgosa
- Reducir el número de personas con las que tiene relaciones sexuales
- Limitar o eliminar el consumo de drogas y alcohol antes y durante las relaciones sexuales
- Tenga una conversación honesta y abierta con su proveedor de atención médica y pregúntele si debe hacerse la prueba de ETS y VIH.

- Hable con su proveedor de atención médica y descubra si la profilaxis previa a la exposición, o PrEP, es una buena opción para prevenir la infección por VIH.

Para obtener más información sobre las ETS y la visita al EPT, visite:

<http://www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/dpc/ept.html>