DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

CUALQUIER COMPAÑERO SEXUAL QUE TIENE UNA HISTORIA DE ALERGIA A ESTE ANTIBIÓTICO O LA CLASE FARMACÉUTICA DE ANTIBIÓTICOS NO DEBE TOMAR ESTE ANTIBIÓTICO Y DEBE SER EXAMINADO INMEDIATAMENTE POR UN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA

SPANISH INFORMATION SHEET FOR CLINDAMYCIN VAGINAL
FOSFATO DE CLINDAMICINA - CREMA VAGINAL

USOS: Este es un medicamento para combatir las infecciones y se usa para el tratamiento de ciertas infecciones vaginales.

MODO DE EMPLEO: Este medicamento es solamente para el uso vaginal. Llene el aplicador con la crema. Inserte el aplicador profundamente dentro de la vagina y empuje el embolo para dejar salir el medicamento. Limpie el aplicador con jabon y agua caliente y enju guelo bien. Se le proporcionar una hoja con instrucciones detalladas junto con el medicamento. Lea las instrucciones y pregunte cualquier duda que usted tenga a su medico o al farmaceutico.
Continue usando el medicamento por el periodo de tiempo completo indicado para asegurar el alivio de la infeccion. La suspension anticipada de esta terapia puede causar la reincidencia de la infeccion.
EFECTOS SECUNDARIOS: Este medicamento puede causar ardor o comezon en la vagina. Estos efectos deber n desaparecer a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Otros efectos secundarios que se han reportado incluyen nausea, acidez, dolor de cabeza y mareo. Comunequese con su medico si cualquiera de estos efectos persiste o se vuelve demasiado molesto.
Avise a su m,dico si usted comienza a sufrir de una erupcion de la piel o si sufre de irritacion vaginal mientras est, usando este medicamento.
PRECAUCIONES: Este medicamento no deber usarse durante el embarazo a menos que sea claramente necesario. Consulte los riesgos y los beneficios con su medico. Puesto que este medicamento se encuentra en pequenas cantidades en la leche materna, usted deber consultar con su medico antes de amamantar.

Avise a su medico si usted padece o ha padecido de colitis o enteritis o si sufre de cualquier alergia, especialmente a los antibioticos.
INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS: Informe a su medico si usted est usando cualquier otro medicamento con o sin receta medica.
Evite el uso de duchas vaginales mientras est, usando este medicamento.
Este medicamento contiene un aceite mineral que puede debilitar o danar al latex o a los productos de hule tales como los condones o los diafragmas. Usted deber evitar el uso de estos productos mientras est, usando este medicamento.

ADVERTENCIAS: Este medicamento no es un agente anticonceptivo.

Es aconsejable evitar las relaciones sexuales vaginales durante el periodo de tratamiento con este medicamento para evitar la reincidencia de la infeccion.

DOSIS OMITIDA: Si usted deja de usar una dosis, usela en cuanto lo recuerde, a menos que sea casi hora de usar la siguiente dosis.

CONSERVACION: Este medicamento deber guardarse a temperatura ambiente, entre 59 y 86 grados F. (15 a 30 grados C.), protegido de la luz y del calor.

DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health

Reviewed 12/19/16 by Cardinal Health Pharmacy Services

DELAWARE HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Division of Public Health